

Varithena[®]
(espuma inyectable de polidocanol) 1%

¿Las varices le molestan?

Varithena mejora el aspecto y los síntomas





Una nueva forma de tratar las varices

Pesadez. Dolor. Prurito. Vivir con varices puede resultar complicado, pero el tratamiento no tiene que serlo.

Retome su vida con Varithena

Cuando desee tratarse las varices y volver a realizar las actividades que le encantan, hay una nueva forma prácticamente indolora. Varithena es un tratamiento suave con espuma que se administra en solo uno o dos pinchazos. La cantidad de pacientes que notificaron dolor en el lugar de la inyección o de la aplicación en los ensayos clínicos fue del 4,0 %.¹ Para la mayoría de pacientes, Varithena mejora los síntomas físicos relacionados con las varices, así como su aspecto.


1. La cantidad de pacientes que notificaron dolor en el lugar de la inyección o de la aplicación en los ensayos clínicos fue del 4,0 %. Datos de BSC registrados.

¿Qué son las varices?


Las varices son venas hinchadas, a menudo azuladas y torcidas de las piernas que sobresalen por encima de la superficie de la piel. Es una dolencia habitual que afecta a muchos hombres y mujeres.

¿Cuáles son las causas de las varices?

Algunos factores le pueden acarrear un mayor riesgo de padecer varices, como los antecedentes familiares, la edad, el sobrepeso o la obesidad, el embarazo y permanecer de pie durante largos períodos de tiempo como parte de su trabajo.



Unas minúsculas válvulas ayudan a las venas de las piernas a contrarrestar la gravedad e impulsar la sangre de vuelta hacia el corazón.



Pero si las válvulas se debilitan, la sangre puede fluir en sentido contrario y acumularse, provocando las varices.

Síntomas de las varices

Las varices no siempre son visibles. A algunas personas les causan dolor, incomodidad y síntomas como:



Pesadez



Dolor



Inflamación



Palpitaciones



Prurito

Un procedimiento rápido y prácticamente indoloro

El tratamiento de las varices implica la inyección de una espuma que provoca que las venas se cierren. Varithena es mínimamente invasivo; la cantidad de pacientes que notificaron dolor en el lugar de la inyección o de la aplicación en los ensayos clínicos fue del 4,0 %.¹ No es necesario realizar incisiones ni suturas y el tratamiento normalmente dura menos de una hora. La mayoría de personas solo requiere un único tratamiento para notar los resultados.

Cómo es el tratamiento

A diferencia de otras espumas, Varithena está aprobado por la FDA. Durante una sesión del tratamiento, un médico inyecta la espuma dentro de las venas afectadas para cerrarlas, lo que permite que la sangre fluya por otras venas más sanas.



¿Cuáles son los efectos secundarios?

Los efectos secundarios más habituales son dolor o incomodidad en las piernas, hematoma o dolor en el lugar de la inyección y coágulos sanguíneos posiblemente graves en las venas de las piernas. Estos no son todos los posibles efectos secundarios de Varithena.

¿Mi seguro cubrirá el tratamiento?

La mayoría de planes de Medicare y planes de seguros cubre el tratamiento con Varithena. La cobertura puede depender de la gravedad de las varices y los síntomas. En la consulta de su médico le pueden ayudar a entender su cobertura.

Por qué el tratamiento es distinto

No se realizan incisiones ni se administra sedación o anestesia general. El médico le puede recomendar Varithena porque, a diferencia de la ablación térmica:



resulta efectivo para tratar venas de distintos tamaños arriba y abajo de la pierna;



no requiere la inserción de ningún cable en toda la longitud de la vena;



se administra solo en uno o dos pinchazos por tratamiento;



no utiliza calor, lo que elimina el riesgo de quemaduras;



y, a diferencia del pegamento, Varithena se disuelve en el torrente circulatorio después del tratamiento, de modo que no deja nada permanente en la vena.



Resultados demostrados y fiables

En los estudios clínicos, la mayoría de pacientes tratados con Varithena experimentó estos resultados **después de solo un tratamiento:**



Mejora de los síntomas

Como la pesadez, el dolor, la inflamación, las palpitaciones y el prurito



Mejora en el aspecto de las venas

En las evaluaciones de los pacientes y los médicos



Pregunte lo que desee

¡Tome el control! Implíquese en la decisión sobre su tratamiento. Hable con el su médico para obtener información sobre sus opciones.

Más información en Varithena.com

1. La cantidad de pacientes que notificaron dolor en el lugar de la inyección o de la aplicación en los ensayos clínicos fue del 4,0 %. Datos de BSC registrados.

VARITHENA (espuma inyectable de polidocanol) 1%

PRECAUCIÓN: La legislación federal (EE. UU.) limita la venta de este dispositivo a médicos o bajo prescripción facultativa.

Antes de utilizarlo, consulte la «Información sobre el producto» en www.bostonscientific.com para obtener más información sobre indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones, acontecimientos adversos e instrucciones del usuario. **INDICACIONES:** Varithena (espuma inyectable de polidocanol) está indicado para el tratamiento de las venas safenas internas insuficientes, las venas safenas accesorias insuficientes y las varices visibles del sistema de venas safenas internas (great saphenous vein, GSV) por encima y por debajo de la rodilla. Varithena mejora los síntomas de la insuficiencia venosa superficial y la aparición de varices visibles. **INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD:**

El uso de Varithena está contraindicado en pacientes alérgicos al polidocanol y aquellos que padezcan una enfermedad tromboembólica aguda. Se han notificado reacciones alérgicas graves después de la administración de polidocanol líquido, como reacciones anafilácticas, algunas de ellas mortales. Observe a los pacientes durante como mínimo 10 minutos después de la inyección y prepárese para tratar la anafilaxia de forma adecuada. La inyección intrarterial o la extravasación de polidocanol puede provocar necrosis grave, isquemia o gangrena. Los pacientes con arteriopatía subyacente pueden tener un mayor riesgo de padecer isquemia en los tejidos. Si se produce la inyección intrarterial de polidocanol, consulte de inmediato a un cirujano vascular. Varithena puede causar trombosis venosa. Siga detenidamente las instrucciones de administración y controle si hay signos de trombosis venosa después del tratamiento. Los pacientes con movilidad reducida, antecedentes de trombosis venosa profunda o embolia pulmonar, o a quienes se les haya realizado una cirugía mayor reciente (en un plazo de 3 meses), hospitalización prolongada o embarazo tienen un mayor riesgo de desarrollar trombosis. Los acontecimientos adversos más habituales que se observaron fueron dolor/incomodidad en las extremidades, retención de coágulos, dolor o hematoma en el lugar de la inyección, extensión del trombo en la vena femoral común, tromboflebitis superficial y trombosis venosa profunda. Los médicos que administren Varithena deben tener experiencia en los procedimientos venosos, poseer conocimientos prácticos detallados del uso de la ecografía dúplex en la enfermedad venosa y tener formación en la administración de Varithena. Consulte www.varithena.com para obtener información completa sobre Varithena. US VARI900104.

Varithena es una marca comercial registrada de Boston Scientific Corporation o sus filiales. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus propietarios correspondientes.

Boston Scientific
Advancing science for life™

Peripheral Interventions
300 Boston Scientific Way
Marlborough, MA 01752-1234
www.bostonscientific.com

Para solicitar el producto o para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente en el teléfono 1.855.971.8346.

© 2020 Boston Scientific Corporation o sus filiales. Todos los derechos reservados.

PI-814604-AA